

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 10-5-71 183259

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION « AUVERGNE ET LIMOUSIN »

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 92-97-11 - Postes 440 & 449)

(ALLIER, CANTAL, CORRÈZE, CREUSE, HAUTE-LOIRE, PUY-DE-DOME, HAUTE-VIENNE)

25,00 F

Régie de Recettes de la D. D. A.

Sous-Régisseur de Recettes du Service de la Protection des Végétaux, Cité Administrative,

C. C. P. : CLERMONT-FERRAND 5.503-17

CLERMONT-FERRAND - 63

Supplément n° 4 au Bulletin n° 127 d'AVRIL 1971.-

V I G N E

BLACK-ROT.- (départements de l'Allier et de la Corrèze)

Les germes susceptibles de provoquer les premières contaminations sont à maturité. Dans les vignes atteintes l'an dernier, ainsi que dans celles situées à proximité de parcelles incultes dans lesquelles la maladie a été précédemment observée, effectuer un traitement (s'il y a lieu, attendre que le stade D soit atteint : voir au verso, le tableau des stades-repères). Dans les autres situations (majorité du vignoble), il est inutile d'intervenir. Pour les produits à utiliser, consulter le bulletin n° 126 de MARS.

BRENNER.-

Dans les vignes où cette maladie est à redouter (les feuilles de la base des rameaux et les inflorescences se dessèchent et tombent, en été), effectuer un traitement avec un produit à base de cuivre, de manèbe, de mancozèbe ou avec une association de zinèbe et de cuivre (intervenir dès que les vignes auront atteint le stade 3 à 4 feuilles étalées).

A R B R E S F R U I T I E R S

TAVELURE.- (Poiriers et Pommiers)

Les risques de contaminations primaires demeurant très importants, il est conseillé de renouveler la protection dès que possible.

S'il y a lieu intervenir, en même temps, contre l'Oïdium, les Acariens (espèces hivernant sous forme d'adultes), les Charançons phyllophages, les Chenilles défoliatrices (dégâts importants, par endroits), les Mineuses du feuillage, les Pucerons, les Psylles.

Dans les vergers en fleurs ne pas utiliser de produits insecticides ou acaricides susceptibles de nuire aux Abeilles.

NOTA.- Il est encore trop tôt pour intervenir contre l'Araignée rouge (acararien le plus courant dans les vergers, hivernant, sur les rameaux, sous forme d'oeufs de couleur rouge).

MONILIA.- (Abricotiers, Cerisiers, Pruniers en particulier).

Effectuer un traitement dès la fin de la floraison avec l'un des produits suivants : benomyl, carbatène, folpel, mancozèbe, thiabendazole, thirame.

S'il y a lieu, intervenir en même temps contre les Chenilles défoliatrices et les Pucerons.

ADDITIF A LA LISTE DES PESTICIDES

A la liste des pesticides homologués, ou en autorisation provisoire de vente (Bulletin n° 126 de Mars), il y a lieu d'ajouter, en ce qui concerne le Mildiou, le Black-Rot et la Pourriture grise de la Vigne :

- association de folpel et de captafol (autorisation provisoire de vente).

Clermont-Ferrand, le 30 Avril 1971.

Le Contrôleur chargé des
Avertissements Agricoles

A. LECLERC.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux :

P. DENIZET.

Imprimerie de la Station de CLERMONT-FERRAND

Directeur-Gérant : L. BOUYX.

Tirage n° 798 du 30 Avril 1971 - ABONNEMENT 1971 - Expédition n° 6
dernière note parue, supplément n° 3 au Bulletin n° 127, le 20 Avril.

7276

Stades repères de la vigne

